

कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी! फुल पिकाचे उत्तम संगोपन करी!!

किसानो के लिए वरदान, दानेदार ज्यादा उपज



उत्पादन में
भारी वृद्धि



प्राकृतिक रूप से
नाइट्रोजन की
बढ़ोतरी



रासायनिक खाद पर
25% से 30% की बचत



किट व रोग प्रबंधन
(रस चूसक कीट, ईल्ली,
झुलसा के लिये)



अधिक माहितीसाठी संपर्क

+91 84840 06196 | +91 84840 06806



वाढ अवस्था/पीक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	फायदे
रोपवाटिका नियोजन			
बीज प्रक्रिया	बी : सीपेल + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट	बी:सीपेल २५ ग्रॅम + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम / किलो बियाण्यास चोळून पेरणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> > निरोगी व चांगली उगवण > मुळांचा जोमदार विकास > जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीचे जैव व्यवस्थापन
सूत्रकृमी व जमीनजन्य बुरशी नियंत्रण (लागवडीनंतर १५ व ३० व्या दिवशी)	नेमॅस्टीन+ ताबा ड्रीप + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट	नेमॅस्टीन ५ ग्रॅम + ताबा ड्रीप ५ मिली + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम / लिटर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> > सूत्रकृमीचे जैव व्यवस्थापन > रोपांची मर व मुळकुज , हानिकारक बुरशींचा प्रादुर्भाव कमी करतेथांबवते > सूत्रकृमीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला वापर करावा
रोग नियंत्रण	सुडो/सुडो लिक्विड + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम किंवा सुडो लिक्विड ५ मिली + मिलॅस्टीन के २.५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> > सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण > बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रभावी नियंत्रण
कीड नियंत्रण	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली/लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> > सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण > किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्येला वापर करावी
पुनर्लागवड नियोजन			
बेसल डोस	टीबी - ३ (दाणेदार) + ताबा - जी + स्पीड कंपोस्ट + मायकोझूट्स - जी + ३३ कोटी	टीबी - ३ (दाणेदार) ३ किलो + ताबा - जी ४ किलो + स्पीड कंपोस्ट ४ किलो + मायकोझूट्स - जी - २ किलो + ३३ कोटी १५० किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> > पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ > सेंद्रीय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर > संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा > प्रकाशसंश्लेषण व शारीरिक क्रियेत सुधार
रोप लागवडीच्या वेळी (कॉलर रॉट , मर नियंत्रण)	टीबी - ३ : फर्टीडोस + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट + मायकोझूट्स	टीबी - ३ : फर्टीडोस ५ मिली + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम + मायकोझूट्स ३ ग्रॅम/लिटर प्रमाणे द्रावणात रोपे बुडवून लावावी	<ul style="list-style-type: none"> > जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीचे जैव व्यवस्थापन > पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ > मुळांचा जोमदार विकास
वाढीच्या अवस्थेत	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> > सर्व प्रकारचे जैविक व अजैविक ताण नियंत्रण > पिकांमध्ये जीवनसत्वे व संप्रेरके यांचे प्रमाण वाढवते > निरोगी शाखीय वाढ
फुलधारणा व फुलगळ नियंत्रण (पुनर्लागवडीनंतर दर २५-३० दिवसांनी)	ताबा + व्हायटरमोन + ब्रिगेड-बी	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली + ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम/ लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> > सर्व प्रकारचे जैविक व अजैविक ताण नियंत्रण > फुलधारणेत वाढ , फुलगळ नियंत्रण > निरोगी शाखीय वाढ
रोग नियंत्रण (पुनर्लागवडीनंतर १५-२० दिवसांनी) (डाऊनी , धुरी , करणा , केवडा)	सुडो/सुडो लिक्विड + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम किंवा सुडो लिक्विड ५ मिली + मिलॅस्टीन के २.५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> > सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण > बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रभावी नियंत्रण
कीड नियंत्रण (पुनर्लागवडीनंतर १५-२० दिवसांनी) (मिलीबग , पाढरी माशी , मावा , कोळी , तुडतुडे)	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली/लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> > सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींचे नियंत्रण > किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण > किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्येला वापर करावी
सूत्रकृमी नियंत्रण (जून ते ऑक्टोबर पर्यंत दर अमावस्येला)	नेमॅस्टीन + ताबा ड्रीप	नेमॅस्टीन १ किलो + ताबा ड्रीप १ लिटर/ एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> > सूत्रकृमीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला वापर करावा
फुल काढणीच्या अवस्थेत (पुनर्लागवडीच्या ४५-५५ दिवसांनी)	टीबी - २ (दाणेदार/फर्टीडोस) + ००.५२:३४ / ००.००:५०	टीबी - २ दाणेदार २ किलो / फर्टीडोस- ५०० मिली + ००.५२:३४ / ००.००:५० - ५-७ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> > टिकवण क्षमता सुधारते > फुलांचा आकार , गुणवत्ता , रंग , चकाकी वाढवते > उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारते

ब्रिगेड-बी/ब्रिग बॉस + सिलीकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर
 कॅन बायोसिसच्या उत्पादनांचा वापर कॉपर आणि अँटिबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी. फवारणी करताना फांद्या व पाने संपूर्ण भिजवावीत