

# कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! हरभरा पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!

एक समान आकार, भरीव दाणे, जास्त उत्पादन



जमीन अधिक  
कसदार



उत्पादनात भरीव वाढ  
( 15% ते 20%)



रासायनिक  
खतांमध्ये बचत



कीड-रोग  
व्यवस्थापन  
(घाटेअळी, मर)



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा  
+91 84840 06196, +91 84840 06806





# हरभरा पिकाचे वेळापत्रक



वाढ अवस्था/पीक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	उपयोग /फायदे
बीजप्रक्रिया	बी:सीपेल + ट्रायको-शिल्ड कॉम्बॅट	बी:सीपेल ५ ग्रॅम + ट्रायको-शिल्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम / एकर प्रमाणे बियाण्यास चोळून पेरणी करावी	> निरोगी आणि चांगली उगवण > जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीचे जैव व्यवस्थापन > मुळांचा जोमदार विकास
बेसल डोस	टीबी ३ + ताबा-जी+ स्पीड कंपोस्ट+३३ कोटी	टीबी ३ -३ किलो + ताबा जी ४ किलो + स्पीडकंपोस्ट ४ किलो + ३३ कोटी:फरमेंटेड जैविक खत १५०-२०० किलो / एकर	> N, P, K आणि Zn चा शाश्वत पुरवठा > सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर > पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ > पिकाची जोमदार शाखीय वाढ
मर रोग व्यवस्थापन (लागवडीनंतर १० दिवसांनी)	ट्रायको-शिल्ड कॉम्बॅट	ट्रायको-शिल्ड कॉम्बॅट १ किलो / एकर प्रमाणे पाण्यात मिसळून रोपांना मुळांजवळ द्यावे	> मर रोग व्यवस्थापन > जोमदार वाढ व बुरशीजन्य रोगांचे जैव व्यवस्थापन
फुलोरा अवस्था, घाटे भरताना (लागवडीनंतर ३०, ४५ दिवसांनी)	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	> जोमदार शाखीय वाढ > फुलगळ नियंत्रण व फुलांच्या संख्येत वाढ > जैविक व अजैविक ताणतणावांच्या परिस्थितीत पिकाच्या प्रतिकार शक्ती वाढवते
घाटे भरताना (लागवडीनंतर ३०, ४५ दिवसांनी)	टीबी २ दाणेदार/द्रवरूप	टीबी २ (दाणेदार) २ किलो किंवा द्रवरूप ५०० मिली + १२:६१:००-५ किलो /एकर जमिनीतून सोडावे	> P आणि K चा शाश्वत पुरवठा > फुलोरा वाढून घाटांच्या संख्येत वाढ
कीड नियंत्रण	ब्रिगेड-बी/ ब्रिग बॉस महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला व पौर्णिमेला फवारणी करावी	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम /ब्रिग बॉस ५ मिली /लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	> घाटेअळी, पतंग, नागअळी, फुलकिडे,मावा ,तुडतुडे नियंत्रणासाठी
रोग नियंत्रण	सुडो + ट्रायको-शिल्ड कॉम्बॅट	सुडो ५ ग्रॅम + ट्रायको-शिल्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम / लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	> बुरशीजन्य आणि जिवाणूजन्य रोगांचे जैव व्यवस्थापन > करपा, पानांवरील ठिपके, काळी कूज,मर इ. रोगांच्या नियंत्रणासाठी
पीक काढणीच्या वेळी	टीबी २ दाणेदार/द्रवरूप	टीबी २ (दाणेदार) २ किलो किंवा द्रवरूप ५०० मिली + ००:५२:३४-० ००:००:५० ५ किलो /एकर जमिनीतून सोडावे	> P आणि K चा शाश्वत पुरवठा > दाण्यांचा आकार, वजन, गुणवत्ता वाढवण्यासाठी

**ब्रिगेड-बी/ब्रिग बॉस - सिलिकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर किडींच्या सर्व अवस्थांतर प्रभावी नियंत्रणासाठी महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला व पौर्णिमेला वापरावे**

कॅन बायोसिसच्या उत्पादनांचा वापर कॅंपर आणि अॅन्टीबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी, फवारणी करताना फांधा व पाने संपुर्ण भिजवावीत