

# कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! आंबा पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!



नैसर्गिकरीत्या  
नत्राचा पुरवठा



उत्पादनात भरघोस  
वाढ



रासायनिक खतांची  
२५% ते ३०% बचत



कीड व्यवस्थापन  
(रसशोषक, सर्व प्रकारच्या  
अब्ब्यांसाठी)



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196 | +91 84840 06806



www.kanbiosys.com

वाढ अवस्था/पीक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	फायदे
बेसल डोस	टीबी - ३ (दाणेदार ) + ताबा - जी + स्पीड कपोस्ट + मायकोझूट्स (दाणेदार ) + ३३ कोटी	टीबी - ३ (दाणेदार ) ७५ ग्रॅम + ताबा - जी १०० ग्रॅम + स्पीड कपोस्ट १०० ग्रॅम + मायकोझूट्स ५० ग्रॅम + ३३ कोटी ५०० ग्रॅम / झाड	<ul style="list-style-type: none"> <li>पॉन्डच्या मुळांची निरोगी वाढ</li> <li>सॅन्ड्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर</li> <li>संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा</li> <li>प्रकाशशश्लेषण व शारीरिक क्रियेत सुधार</li> </ul>
मृदाजन्य बुरशीच्या नियंत्रणासाठी (जून, सप्टेंबर व डिसेंबर महिन्यांतून एकदा)	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट २ किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> <li>रोपांची मर व मुळकुज थांबवते</li> <li>मातीतून होणारा हानिकारक बुरशीचा प्रादुर्भाव कमी करते</li> </ul>
फुलधारणापूर्व अवस्था	ब्रिगेड बी + सॅन्ड्रिय घटक	ब्रिगेड बी ५० ग्रॅम + सॅन्ड्रिय घटक १ किलो / रेती, मातीत मिसळून झाडाखाली जमीनीत फोकून द्यावे	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऑक्टोबर , नोव्हेंबर महिन्यात सुप्तावस्थेतील सर्व प्रकारच्या किडींच्या नियंत्रणासाठी</li> <li>मितीबगची अंडी , कोष अवस्थेतील मिजमाशी, फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी</li> </ul>
फुलांचे फळात रूपांतर होत असताना व फळ सेंटिंग अवस्था	ताबा + व्हायटरमोन + मिलॅस्टीन के	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली + मिलॅस्टीन के २.५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	उत्तम फुलधारणा व बुरशी विरहित फळधारणा होण्यासाठी
फुलोरा ते फळधारणा अवस्था (१५ दिवसांच्या अंतराने )	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम / ब्रिग बॉस ५ मिली + सिलिकॉन स्टिकर ०.२ मिली / लिटर प्रमाणे खोडावर व जमिनीवर फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>रसशोषक कीड व अळी नियंत्रणासाठी</li> <li>बड माईट, तुडतुडे , मिज माशी , फुलकिडे , स्टोन विविल , फळमाशी, मिली बग, स्केल नियंत्रणासाठी</li> <li>किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी</li> </ul>
फळ सेंटिंग अवस्था	टीबी -३ (फर्टीडोस) + १३:४०:१३	टीबी -३ (फर्टीडोस) ५०० मिली + १३:४०:१३ - ५ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> <li>P आणि K चा शाश्वत पुरवठा , उत्पादनात वाढ</li> <li>फळांचा गुणवत्ता, आकार , रंग, चकाकी व गोडी वाढवण्यासाठी</li> </ul>
फुल व फळगळ नियंत्रणासाठी (३०, ६०, ९० दिवसांच्या अंतराने)	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुल (मोहोर ) व फळगळ नियंत्रणासाठी प्रभावी</li> <li>भरघोस फुलोरा व अधिक फळधारणा</li> </ul>
कीड नियंत्रण (कोवळ्या फांदा व शेंडा पोखरणारी अळी, कोळी, तुडतुडे, मिजमाशी, फुलकिडे, स्टोन विविल, फळमाशी, मिलीबग, स्केल )	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला व पौर्णिमेला फवारणी करावी	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम / ब्रिग बॉस ५ मिली + सिलिकॉन स्टिकर ०.२ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>रसशोषक कीड व अळी नियंत्रणासाठी</li> <li>किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी</li> </ul>
रोग नियंत्रण (फांदीमर , डायबॅक , फळसड, ब्लाइट , भुरी , करपा )	सुडो + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम + मिलॅस्टीन के २.५ मिली + सिलिकॉन स्टिकर ०.३ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>पिकावरील बुरशीजन्य आणि जिवाणुजन्य रोगांचे जैव व्यवस्थापन</li> <li>पावसाळी तसेच आर्द्रतायुक्त वातावरणात, धुके असताना फवारणी अधिक फायदेशीर.</li> </ul>
सुप्तावस्थेतील तुडतुडे, स्टोन विविल (कोयकिड) नियंत्रणासाठी	ब्रिगेड बी	ब्रिगेड बी ५ ग्रॅम / लिटर प्रमाणे झाडाच्या बुंध्यावर चिंब फवारणी करावी	सुप्तावस्थेतील सर्व प्रकारच्या किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी
फळ विकास अवस्था	टीबी - २ : फर्टीडोस + ००:५२:३४	टीबी - २ : फर्टीडोस ५०० मिली + ००:५२:३४ - ५ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून ३ वेळा	<ul style="list-style-type: none"> <li>टिकवण क्षमता सुधारते</li> <li>फळांचा आकार गुणवत्ता रंग चकाकी व गोडी वाढवते</li> <li>उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारते</li> </ul>
फळ पक्वता अवस्था	टीबी - २ : फर्टीडोस + ००:००:५०	टीबी - २ : फर्टीडोस ५०० मिली + ००:००:५० - ५ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून २ वेळा	उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारते
काढणी पूर्व अवस्था	मिलॅस्टीन के	मिलॅस्टीन के ५ मिली / लिटर	काढणीनंतर साठवणीच्या अवस्थेत उद्धवणाऱ्या रोगांच्या नियंत्रणासाठी

## ब्रिगेड-बी- सिलिकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर

कॅन बायोसिसच्या उत्पादनांचा वापर कॉपर आणि अँटिबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी. फवारणी करताना फांद्या व पाने संपूर्ण भिजवावीत