

कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! तांदूळ पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!

तजेलदार रोप, भरपूर लोंब्या, जास्त फुटवे, भरघोस उत्पादन



जमीन अधिक
कसदार



वजनात भरीव वाढ
(१५% ते २०%)



रासायनिक खतांमध्ये बचत
(२५% ते ३०% पर्यंत)



कीड व्यवस्थापन
(लष्करी अळी,
खोड कीड, हुमणी)



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196, +91 84840 06806



भात पिकाचे वेळापत्रक

वाढ अवस्था/पीक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	फायदे
बीज प्रक्रिया	बी : सीपेल + ट्रायको-शील्ड कॉम्बेट	बी:सीपेल १०० ग्रॅम + ट्रायको-शील्ड कॉम्बेट २५० ग्रॅम / एकर बियाण्यास चोळून पेरणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> निरोगी व चांगली उगवण मुळ्यांचा जोमदार विकास जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशींचे जैव व्यवस्थापन
बेसल डोस	टीबी - ३ (दाणेदार) + ताबा - जी + स्पीड कंपोस्ट + ३३ कोटी	टीबी - ३ (दाणेदार) ३ किलो + ताबा - जी ४ किलो + स्पीड कंपोस्ट ४ किलो + ३३ कोटी १५० किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> पांढऱ्या मुळ्यांची निरोगी वाढ सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा प्रकाशसंश्लेषण व शारीरिक क्रियेत सुधार
वाढीच्या अवस्थेत (लागवडीनंतर ३०, ६०, ९० व्या दिवशी)	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारचे जैविक व अजैविक ताण नियंत्रण पिकांमध्ये जीवनसत्वे व संप्रेरके यांचे प्रमाण वाढवते निरोगी शाखीय वाढ
रोग नियंत्रण (करपा, पानावरील ठिपके)	सुडो/सुडो लिक्विड + मिलॅस्टीन के	सुडो १ किलो किंवा सुडो लिक्विड ५ मिली + मिलॅस्टीन के २.५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी सुडो ५ ग्रॅम किंवा सुडो लिक्विड १ लिटर + मिलॅस्टीन के ५०० मिली / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य व जीवाणुजन्य रोगांचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रभावी नियंत्रण
हुमणी नियंत्रण	ब्रिगेड-बी	ब्रिगेड-बी २ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	हुमणी तसेच जमिनीतून पसरणाऱ्या किडींचे नियंत्रण
कीड नियंत्रण (दर ३० दिवसांनी) (खोडकिड, तुडतुडे, पाने गुंडाळणारी अळी, काटेरी भुंगा, लोंबीतील ढेकण्या, गदमाशी)	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	<ul style="list-style-type: none"> सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींचे , हुमणीचे नियंत्रण किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी
दाणे भरण्याच्या अवस्थेत	टीबी - २ (दाणेदार/फर्टीडोस) + ००:५२:३४ / ००:००:५०	टीबी - २ दाणेदार २ किलो / फर्टीडोस- ५०० मिली + ००:५२:३४ / ००:००:५० - ५-७ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> टिकवण क्षमता सुधारते दाण्यांचा आकार, वजन , गुणवत्ता वाढवण्यासाठी उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारते

ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस - सिलिकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर

फॅन बायोलॉजिस्टांच्या उत्पादनांचा वापर कंपर आणि अॅन्टीबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी, फवारणी करतांना फांधा व पाने संपुर्ण भिजवावीत