

# कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! स्ट्रॉबेरी पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!

एक्सपोर्ट क्वालिटी, रेसिड्यू फ्री स्ट्रॉबेरी



संपूर्ण पोषण व जमीन  
अधिक कसदार



गुंतवणुकीचा  
पुरेपूर मोबदला



भरघोस फुलोरा  
क्वालिटीयुक्त फळ



कीड व रोगाच्या जैविक  
व्यवस्थापनासाठी उत्तम



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196, +91 84840 06806





# स्ट्रॉबेरी पिकाचे वेळापत्रक



वाढ अवस्था/पीक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	उपयोग /फायदे
बेसल डोस	टीबी - ३ (दाणेदार ) + ताबा - जी + स्पीड कंपोस्ट + ३३ कोटी + मायकोझूट्स जी	टीबी ३ (दाणेदार ) ३ किलो + ताबा - जी ४ किलो + स्पीड कंपोस्ट ४ किलो + ३३ कोटी १५० किलो + मायकोझूट्स जी २ किलो / एकर	<ul style="list-style-type: none"> <li>संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा</li> <li>सॅट्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर</li> <li>पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ</li> <li>जमिनीची सुपीकता वाढवते</li> </ul>
रोप लागवडीच्या वेळी (मर नियंत्रण)	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट + सुडो	ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम + सुडो ५ ग्रॅम /लिटर प्रमाणे द्रावणात रोपे बुडवून लावावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीचे जैव व्यवस्थापन</li> <li>पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ</li> <li>मुळांचा जोमदार विकास</li> </ul>
पुनर्लागवडीच्या ३० दिवसांनी	टीबी - ३ : फर्टीडोस + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट + मायकोझूट्स	टीबी - ३ : फर्टीडोस ५००मिली + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट १ किलो + मायकोझूट्स १०० ग्रॅम/ एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> <li>N, P, K चा शाश्वत पुरवठा</li> <li>मातीतून होणारा हानिकारक बुरशीचा प्रादुर्भाव कमी करते</li> <li>मुळांचा जोमदार विकास</li> </ul>
वाढीच्या अवस्थेत	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा-२ मिली + व्हायटरमोन -२ मिली/लिटर प्रमाणे पाण्यातून फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>जोमदार शाखीय वाढ &gt; जैविक व अजैविक ताणतणावांच्या परिस्थितीत पिकाची प्रतिकार शक्ती वाढवते</li> <li>फुल व फळधारणेत वाढ</li> <li>प्रकाशसंश्लेषण व शारीरिक क्रियेत सुधार</li> </ul>
मर, मुळकूज व सुत्रकृमी नियंत्रण	नेमॅस्टीन + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट + ताबा ड्रीप	नेमॅस्टीन १ किलो + ट्रायको-शील्ड कॉम्बॅट १ किलो + ताबा ड्रीप १ लिटर / एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> <li>जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांचे आणि सुत्रकृमींचे जैव व्यवस्थापन</li> <li>जोमदार शाखीय वाढ</li> </ul>
रोग नियंत्रण (दर १०-१५ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी)	सुडो + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम + मिलॅस्टीन के २.५ मिली/लिटर पाण्यातून फवारणी करावी	<ul style="list-style-type: none"> <li>पानावरील ठिपके, भुरी, करपा, काउन रॉट/शोडाकूज, फळकूज नियंत्रणासाठी</li> <li>पावसाळी तसेच अद्रतायुक्त वातावरणात, धुके असताना फवारणी अधिक फायदेशीर.</li> </ul>
कीड नियंत्रण	ब्रिगेड-बी/ ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली/लिटर प्रमाणे फवारणी ब्रिगेड-बी २ किलो किंवा ब्रिग बॉस १ लिटर/एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> <li>किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण</li> <li>रस शोषक कीड, खोड व फळ पोखरणारी अळी, हुमणी नियंत्रणासाठी</li> <li>किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी</li> </ul>
वाढीच्या व फुलोरापूर्व अवस्थेत	टीबी - ३ : फर्टीडोस + ताबा ड्रीप	टीबी - ३ : फर्टीडोस ५०० मिली + ताबा ड्रीप १ लिटर /एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> <li>उत्तम शाकीय वाढ</li> <li>अन्नद्रव्यांचा समतोल पुरवठा</li> <li>फुलधारणेत सुधार</li> </ul>
फुलोरा व फळ सेटिंग अवस्थेत	टीबी - २ : फर्टीडोस + ताबा ड्रीप	टीबी - २ : फर्टीडोस ५०० मिली + ताबा ड्रीप १ लिटर /एकर प्रमाणे जमिनीतून	<ul style="list-style-type: none"> <li>P आणि K चा शाश्वत पुरवठा</li> <li>फळांचा आकार, वजन ,रंग व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी</li> </ul>

## ब्रिगेड-बी/ब्रीग बॉस - सिलीकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर

कॅन बायोलॉजिस्टांच्या उत्पादनांचा वापर कॅंपर आणि अॅन्टीबायोटिक सोबत करू नये. उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी, फवारणी करतांना फांघा व पाने संपुर्ण भिजवावीत